

## Pflanzenbau Aktuell Nr. 9/2019 Fungizidbehandlung Wintergerste – T1-Segment

Die Wintergerstenbestände sind dieses Jahr sehr unterschiedlich zu betrachten. Durch die extrem verschiedenen Verhältnisse im Herbst, sind in den trockeneren Regionen die Bestände zum Teil sehr lückig aufgelaufen, während an anderen Orten ein Überwachsen der Gerste befürchtet werden musste. Die überdurchschnittlich lange Vegetationszeit bis in den Dezember hinein, der milde Winter und die geschlossene Schneedecke auf offenem Boden boten sehr gute Bedingungen für **Pilzinfektionen**. Durch die warmen Temperaturen der letzten Tage beginnen die Bestände nun mit der **Schossphase**. Insbesondere in üppigen Beständen finden sich bereits erste **Netzflecken**. Regional ist auch **Mehltau** auf den neuen Blättern zu finden. Im intensiven Anbau sind bei frühem Krankheitsdruck Doppelbehandlungen nach wie vor hoch wirtschaftlich. Kontrollieren Sie deshalb Ihre Bestände regelmäßig!

### Produktauswahl: T1-Fungizide Wintergerste

Produkt	max. Aufwand- menge (l bzw. kg/ha)	Mehltau		Netz- flecken	Zwerg- rost	Gewässerabstand (m)	
		Stopp- Wirk.	Dauer- Wirk.			Hangnei- gung > 2 %	Abdriftminderung (0, 50, 75, 90 %)
<b>Mehltau-Spezialisten</b>							
<b>Property 180 SC</b>	0,5	x(x)	xx(x)	-	-	-	15, *, *, *
<b>Talius</b>	0,25	x(x)	xxx	-	-	-	5, 5, *, *
<b>Vegas</b>	0,375	xx	xx	-	-	-	*, *, *, *
<b>Azole</b>							
<b>Ampera</b>	1,5	(x)	(x)	x	xx(x)	10	10, 5, 5, *
<b>Capalo</b>	2,0	xx	xx(x)	xx	xxx	10	n.z., 15, 10, 5
<b>Cirkon<sup>1)</sup></b>	1,1	(x)	(x)	xx	x(x)	-	5, *, *, *
<b>Eleando</b>	3,0	(x)	x	xx	xxx	-	5, 5, *, *
<b>Folicur/Lynx</b>	1,25	x	x(x)	x	xx(x)	10	10, 5, 5, *
<b>Gladio<sup>1)</sup></b>	0,8	xx	xx	xx	xx	20	n.z., n.z., 20, 10
<b>Input classic</b>	1,25	xx	xx	xx	xx	20	20, 20, 15, 15
<b>Packs</b>							
<b>Comet + Curbatur</b>	1,25 + 0,8	(x)	x	xxx	xxx	10	15, 10, 5, 5
<b>Vegas-Proline-Pack</b>	0,2 + 0,8	xx	xx	xx	xx	10	5, 5, *, *

<sup>1)</sup> Aufbrauchfrist: 19.03.2020

\* länderspezifischen Gewässerabstand beachten!

### Kombinationsmöglichkeit mit Blattdüngern

Die starken Schwankungen von Tagestemperaturen um + 18°C auf bis zu – 4°C nachts sowie der höhere Druck durch Schadpilze haben die Entwicklung der Wintergerste in den letzten 14 Tagen teilweise beeinträchtigt. Um die Versorgung mit **Mikronährstoffen** über das Frühjahr hinweg abzusichern und die **Stresssituationen abzupuffern**, bietet sich der Einsatz von **1,5 l/ha BeiselenTOP GetreideMix** an. Die Mischbarkeit mit gängigen Fungiziden ist gegeben, achten Sie unbedingt auf die richtige Reihenfolge der Mischpartner beim Ansetzen der Spritzbrühe.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!

Bausch Landesprodukte GmbH & Co. KG  
Obere Mühle 2  
74343 Sachsenheim

Tel.: 07147 - 77 96  
Fax.: 07147 - 61 06

info@bausch-landesprodukte.de  
http://www.bausch-landesprodukte.de/